

Wirtschaftsvolk (& Maischwarm)

Drohnenrahmen schneiden

so oft wie möglich,
je öfter, desto besser



Gemülldiagnose (3-tägig) durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von
über 10 Varroa/Tag:
eine gut wirksame Kurzzeit-Behandlung mit
Ameisensäure durchführen

Wenn unter 10 Varroa/Tag, NICHT
behandeln, so Brut und Bienen schonen!

sondern
entweder
**„Teilen &
Behandeln“**
= noch spät
Völker
vermehrten,
Varroa-
Behandlung
mit Oxalsäure

oder
Abwarten bis Mitte August
sodann **Start Spätsommerpflege**
= Einengen durch Entnahme des
unteren Brutraums (Waben-
hygiene), direkt folgend eine gut
wirksame AS-Kurzzeit-
Behandlung, danach Einfütterung

Gemülldiagnose (3-tägig) durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von
über 5 Varroa/Tag:
eine weitere gut wirksame Kurzzeit-Behandlung mit
Ameisensäure durchführen

Gemülldiagnose (3-tägig) durchführen

Bei Milbenfall
von **über 1 Varroa/Tag:**
Restentmilbung
durch **Oxalsäure träufeln**
sonst keine
Behandlung nötig



Ableger

in brutfreier Phase
mit **Milchsäure**
einsprühen



Gemülldiagnose durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von
über 5 Varroa/Tag:
eine gut wirksame Kurzzeit-
Behandlung mit **Ameisensäure**
durchführen

Wenn unter 5 Varroa/Tag, NICHT
behandeln, so Brut und Bienen
schonen!

ab
Mitte
August

Bis Anfang September weiterhin
nur etwas füttern, entwickeln und
Waben ausbauen lassen.
Dann Winterauffütterung.

Gemülldiagnose durchführen

Bei natürlichem Milbenfall von
über 1 Varroa/Tag:
eine gut wirksame Kurzzeit-
Behandlung mit **AS** durchführen

Gemülldiagnose durchführen

Bei **über**
1 Varroa/Tag:

Restentmilbung
durch **OS**
träufeln

sonst keine
Behandlung nötig

